

---

# จำนวนจริง


---

## สารบัญ

จำนวนชนิดต่างๆ.....	1
สมบัติการเท่ากัน.....	5
สมบัติการบวกและคูณ .....	7
พหุนาม.....	9
การแยกตัวประกอบพหุนาม .....	13
สมการตัวแปรเดียว .....	17
สมบัติการไม่เท่ากัน.....	25
ช่วง.....	28
อสมการตัวแปรเดียว.....	30
ค่าสัมบูรณ์.....	38
สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์.....	41

## จำนวนชนิดต่างๆ

จำนวนเต็ม (I) คือ จำนวนที่ลงตัวเป็นเลขเต็มหน่วย ไม่มีส่วนที่เป็นเศษส่วนหรือทศนิยม




จำนวนเต็ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- จำนวนเต็มบวก ( $I^+$ ) หรือ จำนวนนับ หรือ จำนวนธรรมชาติ (N) ได้แก่ 1, 2, 3, ...
- จำนวนเต็มศูนย์ ( $I^0$ ) ได้แก่ 0
- จำนวนเต็มลบ ( $I^-$ ) ได้แก่ -1, -2, -3, ...

หมายเหตุ: จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุด คือ 1 แต่จะไม่มีจำนวนเต็มบวกที่มากที่สุด  
จำนวนเต็มลบที่มากที่สุด คือ -1 แต่จะไม่มีจำนวนเต็มลบที่น้อยที่สุด

จำนวนตรรกยะ (Q) คือ จำนวนที่เขียนในรูป  $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{\text{จำนวนเต็ม}}$  ได้ (เมื่อตัวส่วน  $\neq 0$ )



จำนวนตรรกยะ ประกอบด้วย

- จำนวนเต็ม เพราะเขียนเป็น  $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{1}$  ได้ เช่น  $5 = \frac{5}{1}$ ,  $-2 = \frac{-2}{1}$
- เศษส่วน ที่อยู่ในรูป (หรือทำให้อยู่ในรูป)  $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{\text{จำนวนเต็ม}}$  ได้ (เมื่อตัวส่วน  $\neq 0$ )
- ทศนิยม ร้อย เพราะเขียนเป็น  $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{\text{สิบร้อย พัน}}$  ได้ เช่น  $0.7 = \frac{7}{10}$ ,  $1.53 = \frac{153}{100}$
- ทศนิยม ไม่ร้อย ซ้ำ เพราะมีสูตรแปลงเป็นเศษส่วนได้  
เช่น  $0.\dot{3} = \frac{3}{9}$ ,  $0.\dot{3}2\dot{6} = \frac{326}{999}$ ,  $0.12\dot{3}5\dot{6} = \frac{12356-12}{99900} = \frac{12344}{99900}$

จำนวนอตรรกยะ (Q') คือ จำนวนที่เขียนในรูป  $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{\text{จำนวนเต็ม}}$  ไม่ได้ ซึ่งประกอบด้วย

- ทศนิยม ไม่ร้อย ไม่ซ้ำ เช่น 1.010010001..., 2.21452301520136455202...
- พวกถอดรากไม่ลงตัว เช่น  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{5}$ ,  $\sqrt{10}$ , ...
- ค่าคงที่พิเศษบางตัว เช่น  $\pi$ ,  $e$

หมายเหตุ:  $\pi$  ไม่ได้เท่ากับ  $\frac{22}{7}$  หรือ 3.14 แต่  $\pi$  มีค่าประมาณ  $\frac{22}{7}$  หรือ 3.14


ค่า  $\pi$  จริงๆ มีค่าเท่ากับ 3.141592653589793238462643383279502884197169399...

หมายเหตุ2: ควรจำค่าประมาณของ  $\sqrt{2}$  และ  $\sqrt{3}$  ให้ได้ ( $\sqrt{2} \sim 1.414$ ,  $\sqrt{3} \sim 1.732$ )

การบวกลบคูณหาร ของจำนวนตรรกยะและอตรรกยะ จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

- จำนวนตรรกยะ บวกลบคูณหารกัน ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนตรรกยะเสมอ (เมื่อตัวหาร  $\neq 0$ )
- จำนวนอตรรกยะ บวกลบคูณหารกัน มีสิทธิ์เป็น ตรรกยะ หรือ อตรรกยะ ก็ได้  
 เช่น  $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6} \rightarrow \text{อต} \times \text{อต} = \text{อต}$   
 $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4 \rightarrow \text{อต} \times \text{อต} = \text{ต}$
- ตรรกยะ บวกลบ อตรรกยะ ได้ อตรรกยะ เสมอ  
 ตรรกยะ คูณหาร อตรรกยะ ได้ อตรรกยะ เสมอ ยกเว้น กรณีที่จำนวนตรรกยะนั้นเป็นศูนย์

จำนวนจริง (R) คือ จำนวนที่มีอยู่จริงๆ (บนเส้นจำนวน) ซึ่งประกอบด้วย จำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ ดังรูป



และเราสามารถเติมเครื่องหมาย + หรือ - ไปบนหัว R หรือ Q ได้

- $R^+$  หมายถึง จำนวนจริงที่เป็นบวก
- $R^-$  หมายถึง จำนวนจริงที่เป็นลบ
- $Q^+$  หมายถึง จำนวนตรรกยะที่เป็นบวก
- $Q^-$  หมายถึง จำนวนตรรกยะที่เป็นลบ

หมายเหตุ: จำนวนทุกจำนวนที่เรารู้จักในชั้นนี้ จะเป็นจำนวนจริงทั้งหมด

จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง ได้แก่ รากที่คู่ของจำนวนลบ เช่น  $\sqrt{-1}$  ซึ่งจะได้เรียนในเรื่องจำนวนเชิงซ้อน

**แบบฝึกหัด**

1. ข้อใดถูกต้อง

- |  |   |
|--|---|
| 1. $-1$ เป็นจำนวนจริง                              | 2. $\sqrt{2}$ เป็นจำนวนตรรกยะ               |
| 3. $5$ เป็นจำนวนตรรกยะ                             | 4. $\frac{\pi}{2}$ เป็นจำนวนตรรกยะ          |
| 5. $\frac{30}{6}$ เป็นจำนวนนับ                     | 6. $0$ เป็นจำนวนอตรรกยะ                     |
| 7. $\sqrt{25}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ                    | 8. $\frac{22}{7}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ          |
| 9. $12.45254$ เป็นจำนวนตรรกยะ                      | 10. $1.212121\dots$ เป็นจำนวนอตรรกยะ        |
| 11. $\frac{2}{5}$ เป็นทั้งจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริง | 12. $0$ เป็นทั้งจำนวนเต็มบวก และจำนวนเต็มลบ |

13. 1 เป็นทั้งจำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ และจำนวนจริง
14.  $1 + \sqrt{2}$  เป็นจำนวนอตรรกยะ
15.  $\sqrt{3} - \sqrt{2}$  เป็นจำนวนตรรกยะ
16.  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$  เป็นจำนวนอตรรกยะ
17.  $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$  เป็นจำนวนอตรรกยะ
18. จำนวนนับบางจำนวน เป็นจำนวนอตรรกยะ
19. จำนวนอตรรกยะทุกจำนวน เป็นจำนวนจริง
20. จำนวนตรรกยะบางจำนวน เป็นจำนวนเต็ม
21. ทศนิยมซ้ำทุกตัว เขียนในรูป  $\frac{\text{จำนวนเต็ม}}{\text{จำนวนเต็ม}}$  ได้
2. จงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ (ถ้ามี)
1. จำนวนเต็มลบ ที่มากที่สุด
2. จำนวนเต็ม ที่น้อยที่สุด
3. จำนวนเต็มบวก ที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า 3
4. จำนวนเต็มลบ ที่น้อยที่สุด ที่มากกว่า  $-1$
5. จำนวนเต็มลบ ที่มากที่สุด ที่น้อยกว่า 8
6. จำนวนเต็มบวก ที่มากที่สุด ที่มากกว่า 5
7. จำนวนตรรกยะ ที่มากที่สุด ที่น้อยกว่า 2
8. จำนวนอตรรกยะ ที่มากที่สุด ที่น้อยกว่า 2
3. ให้  $A = \sqrt{2} - 1.4$ ,  $B = \pi - 3.1$  และ  $C = \frac{5}{3} - 1.6\bar{3}$  จงเรียงลำดับ  $A, B, C$  จากน้อยไปมาก  
[O-NET 56/3]
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีจำนวนตรรกยะอยู่เพียงสองจำนวน [O-NET 56/2]
1.  $-\sqrt{4}$ ,  $\pi - \frac{22}{7}$ , 1.010010001
2.  $\sqrt[3]{2}$ ,  $\sqrt{8}$ ,  $\pi^2$
3.  $\pi + 1$ ,  $\sqrt{16}$ , 0.101001000100001...
4.  $\frac{9}{11}$ , 1.11111...,  $\sqrt[3]{8}$
5.  $0.\dot{8}$ ,  $\sqrt{8} - \sqrt{2}$ ,  $\sqrt[3]{3}$

5. ข้อใดถูกต้องบ้าง [O-NET 53/3]

1. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ
2. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ

6. ให้  $a$  และ  $b$  เป็นจำนวนตรรกยะที่แตกต่างกัน ให้  $c$  และ  $d$  เป็นจำนวนตรรกยะที่แตกต่างกัน  
ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นถูกต้องบ้าง [O-NET 52/5]

1.  $a - b$  เป็นจำนวนตรรกยะ
2.  $c - d$  เป็นจำนวนตรรกยะ

7. ค่าของ  $(\sqrt{3} - 1)^{-2}$  เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้เป็นบ้าง [O-NET 54/4]

1. เป็นจำนวนตรรกยะ
2. เป็นจำนวนที่น้อยกว่า 1.8

8. ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นถูกต้องบ้าง [O-NET 52/1]

1. มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 0
2. มีจำนวนตรรกยะที่น้อยที่สุดที่มากกว่า 0

## สมบัติการเท่ากัน

จำนวนจริง มีสมบัติเกี่ยวกับการเท่ากันอยู่ 5 ข้อ ดังนี้

- สมบัติการสะท้อน  $a = a$  เสมอ
- สมบัติการสมมาตร ถ้า  $a = b$  แล้ว  $b = a$
- สมบัติการถ่ายทอด ถ้า  $a = b$  และ  $b = c$  แล้ว  $a = c$
- สมบัติการบวกด้วยตัวเท่า ถ้า  $a = b$  แล้ว  $a + c = b + c$
- สมบัติการคูณด้วยตัวเท่า ถ้า  $a = b$  แล้ว  $ac = bc$

ที่ผ่านมา เราได้ใช้สมบัติเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว

เช่น ในการแก้สมการ

$$\begin{array}{rcl} 2x - 3 & = & 7 \\ 2x - 3 + 3 & = & 7 + 3 \quad \rightarrow \text{บวกด้วยตัวเท่า} \\ 2x & = & 10 \\ 2x \cdot \frac{1}{2} & = & 10 \cdot \frac{1}{2} \quad \rightarrow \text{คูณด้วยตัวเท่า} \\ x & = & 5 \end{array}$$

## แบบฝึกหัด

1. จงบอกชื่อสมบัติที่ทำให้การเท่ากันในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริง

1.  $3 = 3$

2. ถ้า  $x - 1 = 5$  แล้ว  $x - 1 + 1 = 5 + 1$

3. ถ้า  $z = -1$  แล้ว  $-1 = z$

4. ถ้า  $x = y + 1$  และ  $y + 1 = z + 2$   
แล้ว  $x = z + 2$

5. ถ้า  $x = 6$  แล้ว  $3x = 18$

6. ถ้า  $x + 1 = 2a + b$  และ  $2a + b = 5$   
แล้ว  $x + 1 = 5$

7. ถ้า  $x + 2 = 6$

8. ถ้า  $\frac{x}{2} = 3$  แล้ว  $x = 6$

แล้ว  $x + 2 + (-2) = 6 + (-2)$

9. ถ้า  $x + 3 = 4$  แล้ว  $x = 1$

10.  $7 \times (9 - 1) = 7 \times (9 - 1)$

11. ถ้า  $3(x + 1) = 6$  แล้ว  $x + 1 = 2$

12. ถ้า  $x + y = x$  แล้ว  $x = x + y$

2. จงเติมสมบัติที่ใช้ในการแก้สมการต่อไปนี้

$$\begin{array}{rcl}
 5 - 3x = 23 & & \\
 5 = 23 + 3x & \rightarrow & 1. \dots\dots\dots \\
 -18 = 3x & \rightarrow & 2. \dots\dots\dots \\
 -6 = x & \rightarrow & 3. \dots\dots\dots \\
 x = -6 & \rightarrow & 4. \dots\dots\dots
 \end{array}$$



## สมบัติการบวกและคูณ

จำนวนจริง มีสมบัติเกี่ยวกับการบวกและการคูณอยู่ 11 ข้อ ดังนี้

	การบวก	การคูณ
สมบัติปิด	จำนวนจริงบวกกัน ยังคงได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริง	จำนวนจริงคูณกัน ยังคงได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริง
สมบัติสลับที่	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
สมบัติเปลี่ยนกลุ่ม	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
สมบัติการมีเอกลักษณ์	มีเอกลักษณ์การบวก คือ 0	มีเอกลักษณ์การคูณ คือ 1
สมบัติการมีอินเวอร์ส	จำนวนจริงทุกตัว มีอินเวอร์สการบวกที่เป็นจำนวนจริง	จำนวนจริงทุกตัว (ยกเว้น 0) มีอินเวอร์สการคูณที่เป็นจำนวนจริง
สมบัติการแจกแจง	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$	

จำนวนที่ไม่ใช่จำนวนจริง อาจมีหรือไม่มีสมบัติปิด ก็ได้

เช่น จำนวนเต็ม มีสมบัติปิดการบวก เพราะ ถ้าเราเอาจำนวนเต็มมาบวกกัน จะยังคงได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มอยู่

จำนวนคู่ มีสมบัติปิดการคูณ เพราะ ถ้าเราเอาจำนวนคู่มาคูณกัน จะยังคงได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนคู่อยู่

จำนวนอตรรกยะ ไม่มีสมบัติปิดการคูณ เพราะ มีจำนวนอตรรกยะบางคู่คูณกันแล้วไม่ใช่อตรรกยะ

$$\text{เช่น } \sqrt{3} \times \sqrt{3} = \sqrt{9} = 3$$

“เอกลักษณ์” หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีค่า ไม่ว่าเอาไปทำกับอะไรก็ได้ค่าเท่าเดิม

- เอกลักษณ์การบวก คือ 0 เพราะ  $0 + a = a + 0 = a$
- เอกลักษณ์การคูณ คือ 1 เพราะ  $1 \times a = a \times 1 = a$

“อินเวอร์ส” หมายถึง ตัวตรงข้าม ที่จะหักล้างค่าให้หายไป กลายเป็นเอกลักษณ์

เช่น อินเวอร์สการบวก ของ 2 คือ  $-2$  เพราะ  $2 + (-2) = (-2) + 2 = 0$

อินเวอร์สการบวก ของ  $-7$  คือ 7 เพราะ  $(-7) + 7 = 7 + (-7) = 0$

อินเวอร์สการบวก ของ  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  คือ  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$  เพราะ  $\frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$

อินเวอร์สการบวก ของ 0 คือ 0 เพราะ  $0 + 0 = 0 + 0 = 0$

อินเวอร์สการคูณ ของ 2 คือ  $\frac{1}{2}$  เพราะ  $2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$

อินเวอร์สการคูณ ของ  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  คือ  $\frac{2}{\sqrt{3}}$  เพราะ  $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1$

อินเวอร์สการคูณ ของ  $-\frac{2}{3}$  คือ  $-\frac{3}{2}$  เพราะ  $\left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) = 1$

อินเวอร์สการคูณ ของ 0 จะหาไม่ได้ เพราะ ไม่มีอะไรเลย ที่คูณกับ 0 แล้วได้ 1

แบบฝึกหัด

1. จำนวนต่อไปนี้ มีสมบัติปิด การบวก และ / หรือ การคูณ หรือไม่
  1. จำนวนคู่
  2. จำนวนคี่
  3. จำนวนนับ
  4. จำนวนเต็ม
  5. จำนวนเต็มลบ
  6. จำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว
  7. จำนวนตรรกยะ
  8. จำนวนอตรรกยะ
  
2. ข้อใดต่อไปนี้ ถูกต้อง
  1.  $x + y = x + y$  เป็นจริงตามสมบัติการสลับที่การบวก
  2.  $x \cdot 2 = 2 \cdot x$  เป็นจริงตามสมบัติการสลับที่การคูณ
  3.  $2 + (3 + 4) = (3 + 4) + 2$  เป็นจริงตามสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก
  4. จำนวนจริงบางจำนวน ไม่มีอินเวอร์สการคูณ
  5. ถ้า  $a$  เป็นอินเวอร์สการบวกของ  $b$  แล้ว จะได้ว่า  $b$  เป็นอินเวอร์สการบวกของ  $a$  ด้วย
  6.  $x + (y \cdot z) = (x + y)(y + z)$  เป็นจริงตามสมบัติการแจกแจง
  
3. จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง
  1. อินเวอร์สการบวกของ 8 คือ
  2. อินเวอร์สการคูณของ 2 คือ
  3. อินเวอร์สการบวกของ  $\frac{1}{2}$  คือ
  4. อินเวอร์สการคูณของ  $-2$  คือ
  5. อินเวอร์สการบวกของ 0 คือ
  6. อินเวอร์สการบวกของ  $-1$  คือ
  7. อินเวอร์สการคูณของ 1 คือ
  8. อินเวอร์สการคูณของ  $\sqrt{2}$  คือ
  9. อินเวอร์สการบวกของ  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  คือ
  10. อินเวอร์สการคูณของ  $\frac{x}{x+1}$  คือ
  
4. ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [O-NET 52/4]
  1. สมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของจำนวนจริงกล่าวว่า  
สำหรับจำนวนจริง  $a$  จะมีจำนวนจริง  $b$  ที่  $b + a = 0 = a + b$
  2. สมบัติการมีอินเวอร์สการคูณของจำนวนจริงกล่าวว่า  
สำหรับจำนวนจริง  $a$  จะมีจำนวนจริง  $b$  ที่  $ba = 1 = ab$

พหุนาม

หัวข้อนี้ จะทบทวนคำศัพท์ที่ควรทราบในเรื่องพหุนาม

- เอกนาม คือ การคูณกันของ ตัวเลข กับ ตัวแปร ยกกำลัง เต็มบวก หรือ ศูนย์  
เช่น  $2x^5$ ,  $-3a^4b^2$ ,  $\sqrt{5}x^3y^2z$ ,  $x^2$ ,  $6$ ,  $-x$ ,  $2^{-1}xy$ ,  $0$
- “สัมประสิทธิ์” คือ ส่วนที่เป็นตัวเลข, “ดีกรีของเอกนาม” คือ ผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปร

เอกนาม	$2x^5$	$-3a^4b^2$	$\sqrt{5}x^3y^2z$	$x^2$	$6$	$-x$	$2^{-1}xy$	$0$
สัมประสิทธิ์	2	-3	$\sqrt{5}$	1	6	-1	$2^{-1}$	0
ดีกรี	5	6	6	2	0	1	2	หาไม่ได้

- บวกลบเอกนาม บวกได้เฉพาะเอกนามที่มีชุดตัวแปรเหมือนกัน โดยให้เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกัน  
เช่น  $2x^5 + 3x^5 = 5x^5$                        $3a^2b + a^2b = 4a^2b$   
 $2a^2b - ab^2 = 2a^2b - ab^2$  (บวกลบกันไม่ได้ เพราะชุดตัวแปรไม่เหมือนกัน)  
 $\frac{3}{2}xyz^2 - z^2xy = (\frac{3}{2} - 1)xyz^2 = (\frac{3-1}{2})xyz^2 = \frac{1}{2}xyz^2$
- คูณหารเอกนาม ให้เอาสัมประสิทธิ์ คูณหาร สัมประสิทธิ์ และเอาตัวแปร คูณหาร ตัวแปร ได้เลย  
เช่น  $2a^2b \times 3abc = 6a^3b^2c$                $3xy^2z \times a^2bc = 3a^2bcxy^2z$   
 $\frac{1}{2}x^2 \times \frac{4}{3}x^2 = \frac{2}{3}x^4$                        $\frac{6x^3yz}{2xz^3} = \frac{3x^2y}{z^2}$
- พหุนาม คือ การบวกกันของเอกนาม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป  
เช่น  $2x^5 + 4x + 5$ ,  $3a^2b + b^2 - 2$ ,  $6 - 3x^2$ ,  $2^{-3}$
- เราจะเรียกเอกนามแต่ละตัวที่มาบวกกันเป็นพหุนาม ว่า “พจน์”  
เช่น  $2x^5 + 4x + 5$  มี 3 พจน์ โดยพจน์แรกคือ  $2x^5$ , พจน์ที่สองคือ  $4x$ , พจน์ที่สามคือ 5
- ดีกรีของพหุนาม คือ ดีกรีของเอกนามที่ดีกรีสูงสุดแค่พจน์เดียว

พหุนาม	$2x^5 + 4x + 5$	$3a^2b + b^2 - 2$	$6 - 3x^2$	$2^{-3}$
ดีกรี	5	3	2	0

- เรายนิยามแทน พหุนาม ด้วยสัญลักษณ์  $P(x)$ ,  $Q(x)$ ,  $R(x)$   
และสัญลักษณ์  $P(c)$  จะหมายถึง ค่าของ  $P(x)$  เมื่อแทน  $x$  ด้วย  $c$   
เช่น ถ้าให้  $P(x) = 2x^5 + 4x + 5$  จะได้  $P(1) = 2(1)^5 + 4(1) + 5 = 11$   
 $P(-2) = 2(-2)^5 + 4(-2) + 5 = -67$   
ถ้าให้  $Q(x) = 6 - 3x^2$  จะได้  $Q(0) = 6 - 3(0)^2 = 6$   
 $Q(1) = 6 - 3(1)^2 = 3$

- บวกลบพหุนาม ให้บวกลบเฉพาะเอกนามที่บวกลบกันได้ ถ้าบวกลบกันไม่ได้ก็ให้ปล่อยไว้เหมือนเดิม

เช่น  $(2x^5 + 4x + 5) + (x^5 - x^2 - 2x) = 3x^5 - x^2 + 2x + 5$   
 $(x^2 - 2x - 1) - (2x^2 - x - 2) = x^2 - 2x - 1 - 2x^2 + x + 2$   
 $= -x^2 - x + 1$

- คูณพหุนาม ให้ใช้หลักการกระจาย

เช่น  $(2x^2 + 4x + 5)(x^2 - 2) = 2x^4 - 4x^2 + 4x^3 - 8x + 5x^2 - 10$   
 $= 2x^4 + 4x^3 + x^2 - 8x - 10$

สังเกตว่า ดีกรีของผลลัพธ์ จะเท่ากับ ผลรวมดีกรีของพหุนามที่มาคูณกัน เสมอ

- หารพหุนาม ให้ตั้งหารยาว

เช่น  $(x^2 - 2x + 5) \div (x + 2)$

$$\begin{array}{r}
 x - 4 \\
 x + 2 \overline{) x^2 - 2x + 5} \\
 \underline{x^2 + 2x} \phantom{+ 5} \\
 -4x + 5 \\
 \underline{-4x - 8} \\
 13
 \end{array}$$

โดยจะได้ ตัวตั้ง = (ตัวหาร  $\times$  ผลหาร) + เศษ  
 นั่นคือ  $x^2 - 2x + 5 = (x + 2)(x - 4) + 13$

สังเกตว่า ดีกรีของผลลัพธ์ จะเท่ากับ ดีกรีตัวตั้ง - ดีกรีตัวหาร เสมอ

- การเทียบสัมประสิทธิ์ ทำได้เมื่อ พหุนามมีค่าเท่ากัน ไม่ว่าจะแทน  $x$  ด้วยอะไร

เช่น ถ้า  $ax^3 + bx^2 + cx + d = 2x^3 - 3x^2 + 5$  สำหรับทุกๆ  $x$   
 เราจะได้ทันทีว่า  $a = 2, b = -3, c = 0, d = 5$

แบบฝึกหัด

1. กำหนดให้  $P(x) = x^2 - 1, Q(x) = 3x + 2, R(x) = P(x) - Q(x)$  จงหาค่าของ  $R(2)$
2. ถ้า  $P(x)$  หารด้วย  $2x - 1$  ลงตัว ได้ผลลัพธ์  $x + 2$  แล้ว จงหา  $P(x)$
3. ถ้า  $P(x)$  หารด้วย  $x^2 - 1$  ได้ผลลัพธ์  $2x + 3$  เศษ  $x - 1$  แล้ว จงหา  $P(x)$

4. ถ้า  $ax^2 + bx + c = (2x + 1)(2x - 3)$  แล้ว จงหาค่าของ  $a + b + c$

5. ถ้า  $(ax + 2)(x - b) = 3x^2 + cx + 10$  แล้ว จงหาค่าของ  $a + b + c$

6. ถ้า  $(ax + b)^2 = 4x^2 - 12x + c$  และ  $a > 0$  แล้ว จงหาค่าของ  $a + b + c$

7. ถ้า  $(P(x))^2 = x^2 + 6x + c$  แล้ว จงหาค่า  $c$

8. กำหนดให้  $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 3$  ถ้า  $P(x) = (x^2 + 1)Q(x)$  แล้ว จงหาค่า  $P(1)$

9. ถ้า  $a, b, c$  และ  $d$  เป็นจำนวนจริงซึ่ง  $(x - 1)^2(ax + b) = cx^3 + dx + 4$  ทุกจำนวนจริง  $x$  แล้ว  $a + b + c + d$  เท่ากับเท่าใด [O-NET 54/25]

## การแยกตัวประกอบพหุนาม

“การแยกตัวประกอบ” คือ การ “เขียนให้อยู่ในรูปผลคูณ” ของพหุนามย่อยๆ

เช่น  $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$  เป็นต้น

เทคนิคการแยกตัวประกอบ จะมีหลายวิธี ดังนี้

### 1. ดึงตัวร่วม

ดูว่าแต่ละพจน์ มีอะไรบ้างที่มีเหมือนกัน แล้วดึงสิ่งที่อยู่ในทุกพจน์ออกมา

เช่น  $3a^2bc - 12a^2b^2 + 6ab^2c = (3ab)(ac - 4ab + 2bc)$

$$2x^4 - 4x^3 + 3x^2 = (x^2)(2x^2 - 4x + 3)$$

### 2. จัดหมู่ดึงตัวร่วม

คือการจัดกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่ลักษณะคล้ายกัน ดึงตัวร่วมแต่ละกลุ่มย่อย ให้เกิดตัวร่วมในทุกกลุ่มย่อย

เช่น  $x^3 - 2x^2 + 3x - 6 = (x^3 - 2x^2) + (3x - 6)$

$$= x^2(x - 2) + 3(x - 2)$$

$$= (x^2 + 3)(x - 2)$$

$$x^3 - x^2 - \sqrt{3}x + \sqrt{3} = (x^3 - x^2) - (\sqrt{3}x - \sqrt{3})$$

$$= x^2(x - 1) - \sqrt{3}(x - 1)$$

$$= (x^2 - \sqrt{3})(x - 1)$$

### 3. ใช้สูตร

$$n^2 - l^2 = (n - l)(n + l)$$

$$n^3 - l^3 = (n - l)(n^2 + nl + l^2)$$

$$n^3 + l^3 = (n + l)(n^2 - nl + l^2)$$

$$n^2 + 2nl + l^2 = (n + l)^2$$

$$n^2 - 2nl + l^2 = (n - l)^2$$

$$n^3 + 3n^2l + 3nl^2 + l^3 = (n + l)^3$$

$$n^3 - 3n^2l + 3nl^2 - l^3 = (n - l)^3$$

เช่น  $x^2 - 1 = (x)^2 - (1)^2 = (x - 1)(x + 1)$

$$4x^2 - 3 = (2x)^2 - (\sqrt{3})^2 = (2x - \sqrt{3})(2x + \sqrt{3})$$

$$8x^3 - 27 = (2x)^3 - (3)^3 = (2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$$

$$64x^6 - 1 = (8x^3)^2 - (1)^2 = (8x^3 - 1)(8x^3 + 1)$$

$$= ((2x)^3 - 1^3)((2x)^3 + 1^3)$$

$$= (2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)(2x + 1)(4x^2 - 2x + 1)$$

### 4. กรณิพหุนามอยู่ในรูป $x^2 + bx + c$

$$\begin{array}{c} x^2 + bx + c \\ \begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ + & \times \\ \diagdown & / \\ (x + ?) & (x + ?) \end{array} \end{array}$$

หาตัวเลข 2 ตัว ที่คูณกันได้  $c$   
บวกกันได้  $b$

เช่น  $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$

$$x^2 + 7x + 6 = (x + 1)(x + 6)$$


$$x^2 + 2x - 8 = (x - 2)(x + 4)$$

$$a^2 - 2a - 8 = (a - 4)(a + 2)$$

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

$$x^4 - 6x^2 + 8 = (x^2 - 4)(x^2 - 2)$$

5. กรณียพหุนามอยู่ในรูป  $ax^2 + bx + c$



แตก  $a$  เป็น  $n_1 \times n_2$

แตก  $c$  เป็น  $l_1 \times l_2$

เช็คค่า (ไขว้  $\times$  ไขว้) + (ไขว้  $\times$  ไขว้) ได้  $b$  ใหม่

ถ้าไม่ได้ ให้กลับไปแตก  $n_1, n_2, l_1, l_2$  ใหม่ จนกว่าจะได้

เช่น  $2x^2 + 7x + 6 = (2x + 3)(x + 2)$

$$6x^2 - 17x - 3 = (6x + 1)(x - 3)$$

$$4x^2 - 4x - 3 = (2x - 1)(2x + 3)$$

$$4x^2 - 11x + 6 = (4x - 3)(x - 2)$$

$$6 - n - 2n^2 = (3 - 2n)(2 + n)$$

$$2x^4 - 5x^2 + 2 = (2x^2 - 1)(x^2 - 2)$$

6. ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

6.1. เติมตัวหลัง

$$\begin{aligned}
 x^2 - 6x - 7 &= x^2 - 2(3)(x) + 3^2 - 3^2 - 7 & n^2 \pm 2nl + l^2 &= (n \pm l)^2 \\
 &= (x - 3)^2 - 3^2 - 7 \\
 &= (x - 3)^2 - 16 \\
 &= (x - 3)^2 - 4^2 & n^2 - l^2 &= (n - l)(n + l) \\
 &= (x - 3 - 4)(x - 3 + 4) \\
 &= (x - 7)(x + 1)
 \end{aligned}$$

เช่น  $x^2 + 2x - 5 = x^2 + 2(1)x + 1^2 - 1^2 - 5$   
 $= (x + 1)^2 - 1^2 - 5$   
 $= (x + 1)^2 - 6$   
 $= (x + 1 - \sqrt{6})(x + 1 + \sqrt{6})$

$$\begin{aligned}
 x^2 + 3x + 1 &= x^2 + 2\left(\frac{3}{2}\right)x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\
 &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 1 \\
 &= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \\
 &= \left(x + \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(x + \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2x^2 - 7x - 1 &= 2\left(x^2 - \frac{7}{2}x - \frac{1}{2}\right) \\
 &= 2\left(x^2 - 2\left(\frac{7}{4}\right)x + \left(\frac{7}{4}\right)^2 - \left(\frac{7}{4}\right)^2 - \frac{1}{2}\right) \\
 &= 2\left(\left(x - \frac{7}{4}\right)^2 - \frac{57}{16}\right) \\
 &= 2\left(x - \frac{7}{4} - \frac{\sqrt{57}}{4}\right)\left(x - \frac{7}{4} + \frac{\sqrt{57}}{4}\right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x^2 - 4x + 7 &= x^2 - 2(2)x + 2^2 - 2^2 + 7 \\
 &= (x - 2)^2 - 2^2 + 7 \\
 &= (x - 2)^2 + 3 \\
 &= \text{แยกไม่ได้ (เข้าสู่ตรรกะ } n^2 - l^2 \text{ ไม่ได้)}
 \end{aligned}$$

6.1. เติมตัวกลาง

$$\begin{aligned}
 x^4 + x^2 + 1 &= x^4 + 2x^2 + 1^2 - 2x^2 + x^2 \\
 &= (x^2 + 1)^2 - x^2 \\
 &= (x^2 - x + 1)(x^2 + x + 1)
 \end{aligned}$$



แบบฝึกหัด

1. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

1.  $x^2 + x - 12$

2.  $x^2 - 6x - 16$

3.  $3x^2 + x - 24$

4.  $4x^2 - 19x + 12$

5.  $6x^2 - 3x - 18$

6.  $x^4 - 5x^3 + 6x^2$

7.  $3m^3n^2 - 24n^2$

8.  $2x^3 + x^2 - 8x - 4$

9.  $m^4 - 20m^2 + 64$

10.  $a^6 + 7a^3 - 8$

11.  $x^3 - 3x^2 - 6x + 8$

12.  $x^2 + 5\sqrt{2}x + 12$

2. จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ ด้วยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

1.  $x^2 + 2x - 1$

2.  $x^2 - 4x + 1$

## สมการตัวแปรเดียว

การแก้สมการ คือ การหาค่าที่เมื่อแทนในตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริง

เราจะเรียกค่าที่แทนในตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริง ว่า “คำตอบของสมการ” หรือ “รากของสมการ”

เนื่องจากคำตอบที่ทำให้สมการเป็นจริง อาจมีได้หลายตัว บางทีเราจะใช้คำว่า “เซตคำตอบ” ของสมการ

“เซตคำตอบ” ของสมการ ก็คือ เซตของค่าที่แทนในตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริงนั่นเอง

เช่น เซตคำตอบของสมการ  $x^2 - 3x + 2 = 0$  คือ  $\{1, 2\}$  เพราะเมื่อแทน 1 กับ 2 ลงไปใน  $x$  จะทำให้สมการเป็นจริง

การแก้สมการดีกรี 1 ให้จัดแบ่งข้าง ให้ตัวแปรอยู่ฝั่งหนึ่ง ตัวเลขอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ย้ายข้างให้ฝั่งตัวแปรเหลือ  $x$  เพียงตัวเดียว

$$\begin{aligned} \text{เช่น} \quad 4x + 5 &= 2x - 13 \\ 4x - 2x &= -13 - 5 \\ 2x &= -18 \\ x &= \frac{-18}{2} = -9 \end{aligned}$$

การแก้สมการดีกรี 2 ให้จัดฝั่งหนึ่งให้เป็นศูนย์ ให้สมการอยู่ในรูป  $ax^2 + bx + c = 0$

จากนั้น แยกตัวประกอบ  $ax^2 + bx + c$  แล้วจับให้แต่ละวงเล็บเท่ากับ 0 เพื่อหาคำตอบ

ในกรณีที่แยกตัวประกอบไม่ได้ ให้ใช้สูตร

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\begin{aligned} \text{เช่น} \quad 5 + 2x^2 &= 9 - 4x - x^2 \\ 3x^2 + 4x - 4 &= 0 \\ (3x - 2)(x + 2) &= 0 \\ \begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ 3x - 2 = 0 & x + 2 = 0 \\ x = \frac{2}{3} & x = -2 \end{matrix} \\ x &= \frac{2}{3}, -2 \end{aligned}$$

หรือ

$$\begin{aligned} 5 + 2x^2 &= 9 - 4x - x^2 \\ 3x^2 + 4x - 4 &= 0 \\ \begin{matrix} \swarrow & \downarrow & \searrow \\ a = 3 & b = 4 & c = -4 \end{matrix} \\ x &= \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4(3)(-4)}}{2(3)} \\ &= \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{6} = \frac{-4 \pm 8}{6} \\ &= \frac{4}{6}, \frac{-12}{6} \\ &= \frac{2}{3}, -2 \end{aligned}$$

สูตรหาจำนวนคำตอบ

- สมการ  $ax^2 + bx + c = 0$  จะมีคำตอบได้ไม่เกิน 2 คำตอบที่แตกต่างกัน

- ถ้า  $b^2 - 4ac > 0$  สมการนี้ จะมี 2 คำตอบ
- ถ้า  $b^2 - 4ac = 0$  สมการนี้ จะมี 1 คำตอบ
- ถ้า  $b^2 - 4ac < 0$  สมการนี้ จะไม่มีคำตอบ

เช่น สมการ  $x^2 - 3x + 2 = 0$  จะมี 2 คำตอบ เพราะ  $(-3)^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1 > 0$

สูตรผลบวกราก - ผลคูณราก

- ถ้าสมการ  $ax^2 + bx + c = 0$  มี 2 คำตอบที่แตกต่างกันแล้ว

○ ทั้ง 2 คำตอบจะบวกกันได้  $-\frac{b}{a}$   
 ○ ทั้ง 2 คำตอบจะคูณกันได้  $\frac{c}{a}$

เช่น สมการ  $x^2 - 3x + 2 = 0$  จะมีคำตอบที่บวกกันได้  $-\frac{(-3)}{1} = 3$  และคูณกันได้  $\frac{2}{1} = 2$

ตัวอย่าง ถ้าสมการ  $2x^2 - 4x + m = 0$  มีเพียงคำตอบเดียวแล้ว จงหาค่า  $m$

วิธีทำ สมการ  $ax^2 + bx + c = 0$  จะมี 1 คำตอบ เมื่อ  $b^2 - 4ac = 0$

จะเห็นว่าข้อนี้  $a = 2$  ,  $b = -4$  ,  $c = m$

ดังนั้น  $(-4)^2 - 4(2)(m) = 0$

$16 - 8m = 0$

$2 = m$

#

ตัวอย่าง ถ้าสมการ  $2x^2 - kx + 6 = 0$  มีคำตอบหนึ่งคือ  $\frac{3}{2}$  จงหาอีกคำตอบหนึ่ง

วิธีทำ ข้อนี้ทำได้หลายวิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 โจทย์บอกว่า  $\frac{3}{2}$  เป็นคำตอบหนึ่งของสมการ

$2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - k\left(\frac{3}{2}\right) + 6 = 0$

ดังนั้นถ้าแทน  $\frac{3}{2}$  ลงไปที่  $x$  จะต้องทำให้สมการเป็นจริง

$\frac{9}{2} - \frac{3k}{2} + 6 = 0$

ซึ่งจะหาค่า  $k$  ออกมาได้

$9 - 3k + 12 = 0$

$21 = 3k$

$k = 7$

จากนั้น แทนค่า  $k$  กลับเข้าไปในสมการ

$2x^2 - 7x + 6 = 0$

แล้วหาคำตอบที่เหลือ

$(2x - 3)(x - 2) = 0$

จะได้คำตอบของสมการนี้ คือ 2

$x = \frac{3}{2}, 2$

#

วิธีที่ 2 เราจะทำย้อนกลับจากคำตอบ  $\frac{3}{2}$


$x = \frac{3}{2}, ?$

โดยสลับกลับไปหาสาเหตุของคำตอบนี้

$(2x - 3)(?x + ?) = 0$

$2x^2 - kx + 6 = 0$

จะเห็นว่า  $2x^2 - kx + 6$  ต้องแยกตัวประกอบได้เป็น  $(2x - 3)(?x + ?)$



ดังนั้น อีกตัวประกอบต้องเป็น  $x - 2$

นั่นคือ อีกคำตอบคือ 2 นั่นเอง

#

วิธีที่ 3 จากสูตรผลบวกราก - ผลคูณราก

คำตอบของสมการ  $ax^2 + bx + c = 0$  จะบวกกันได้  $-\frac{b}{a}$  และคูณกันได้  $\frac{c}{a}$

ดังนั้น คำตอบของสมการ  $2x^2 - kx + 6 = 0$  จะคูณกันได้  $\frac{6}{2} = 3$

เนื่องจากคำตอบหนึ่งคือ  $\frac{3}{2}$   
 ดังนั้น อีกคำตอบต้องคูณกับ  $\frac{3}{2}$  แล้วได้ 3  
 นั่นคือ จะได้อีกคำตอบคือ 2

$$\frac{3}{2}x = 3$$

$$x = 3 \times \frac{2}{3} = 2$$

#

การแก้สมการดีกรีสูงกว่า 2 จะทำแบบเดียวกัน คือให้จัดรูปให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์  
 แยกตัวประกอบให้ถึงที่สุด ให้แต่ละวงเล็บเป็นดีกรี 1 หรือ ดีกรี 2  
 จับให้แต่ละวงเล็บเท่ากับ 0 เพื่อหาคำตอบ

ตัวอย่าง จงหาเซตคำตอบของสมการ  $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

วิธีทำ จัดทางขวาให้เป็น 0 แล้วแยกตัวประกอบ

$$x^2(x - 3) - 4(x - 3) = 0$$

$$(x^2 - 4)(x - 3) = 0$$

$$(x - 2)(x + 2)(x - 3) = 0$$

$$x = 2, -2, 3$$

ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $\{2, -2, 3\}$

#

สิ่งที่เป็นปัญหามากสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ก็คือเรื่อง “โจทย์สมการ”

ในเรื่องนี้ โจทย์จะไม่ให้สมการมาตรงๆ แต่จะสร้างเรื่องราวมาเป็นฉากๆ แล้วถามสิ่งที่โจทย์ต้องการ  
 ขั้นตอนในการทำโจทย์สมการ มีดังนี้

- สมมติให้  $x$  แทนปริมาณอะไรบางอย่าง
  - ส่วนใหญ่จะให้  $x$  แทนสิ่งที่โจทย์ถาม เพื่อให้เมื่อแก้หาค่า  $x$  ได้จะได้คำตอบได้เลย
  - หลักสำคัญคือ ให้  $x$  แทนสิ่งที่พื้นฐานของการหาปริมาณต่างๆที่โจทย์กล่าวถึง
- อ่านโจทย์ แล้วเขียนปริมาณต่างๆที่โจทย์กล่าวถึง ในรูปของ  $x$
- จับความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆที่เขียนออกมาในขั้นตอนที่ 2 แล้วสร้างสมการ
- แก้สมการ หาค่า  $x$  ตัดค่า  $x$  ที่ใช้ไม่ได้ทิ้งไป (เช่น ความยาว เป็นเลขติดลบไม่ได้ , จำนวนคน เป็นทศนิยมไม่ได้)  
 แล้วนำค่า  $x$  ไปคำนวณหาสิ่งที่โจทย์ถาม

ตัวอย่าง ที่ดินแปลงหนึ่ง มีด้านยาว ยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 เมตร ถ้าที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ 90 ตารางเมตร จง  
 หาว่าที่ดินแปลงนี้ กว้างและยาว กี่เมตร

วิธีทำ 1. สมมติ  $x$

เราจะให้  $x$  แทนด้านกว้าง นั่นคือ ให้ที่ดินแปลงนี้กว้าง  $x$  เมตร

- เขียนปริมาณต่างๆที่โจทย์กล่าวถึง ในรูปของ  $x$

“สองเท่าของด้านกว้าง” จะเท่ากับ  $2x$  เมตร

ดังนั้น ด้านยาว ต้องยาวกว่า  $2x$  อยู่ 3 เมตร ดังนั้น ที่ดินแปลงนี้ยาว  $2x + 3$  เมตร

ดังนั้น ที่ดินแปลงนี้ มีพื้นที่ = กว้าง  $\times$  ยาว =  $(x)(2x + 3)$  ตารางเมตร

- จับความสัมพันธ์ สร้างสมการ

โจทย์บอกว่าที่ดินแปลงนี้ มีพื้นที่ 90 ตารางเมตร ดังนั้น สมการคือ  $(x)(2x + 3) = 90$

## 4. แก้สมการ แล้วตอบ

$$\begin{aligned}(x)(2x + 3) &= 90 \\ 2x^2 + 3x &= 90 \\ 2x^2 + 3x - 90 &= 0 \\ (2x + 15)(x - 6) &= 0 \\ x &= -\frac{15}{2}, 6\end{aligned}$$

$$\text{ได้ } x = -\frac{15}{2} \text{ กับ } 6$$

แต่ความกว้าง เป็นเลขติดลบไม่ได้ ดังนั้น เหลือ 6 ค่าเดียว

นั่นคือ ที่ดินกว้าง =  $x = 6$  เมตร

$$\text{และยาว} = 2x + 3 = 2(6) + 3 = 15 \text{ เมตร}$$

#

แบบฝึกหัด

1. จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้

1.  $x^2 - 5x + 4 = 0$

2.  $4x^2 - 3x = \frac{9}{2}$

3.  $(x - 3)(x - 5) = 11 - 4x$

4.  $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$

5.  $x^2 + x - 1 = 0$

6.  $x^2 + 4x + 1 = 0$

2. จงพิจารณาว่าสมการต่อไปนี้ มีคำตอบที่แตกต่างกันกี่คำตอบ พร้อมทั้งหาผลบวกและผลคูณของคำตอบนั้น

1.  $x^2 - 5x + 6 = 0$

2.  $x^2 = 9$

3.  $x^2 + x + 1 = 0$

4.  $2x^2 + 3x - 6 = 0$

5.  $x^2 + 6x + 9 = 0$

6.  $x^2 + 1 = 0$

3. ถ้าสมการ  $ax^2 + x - 1 = 0$  มีคำตอบหนึ่งคือ  $\frac{1}{2}$  จงหาคำตอบหนึ่ง

4. ถ้าสมการ  $x^2 - kx + 9 = 0$  มีรากเพียง 1 รากแล้ว จงหาค่า  $k$

5. สมการในข้อใดต่อไปนี้มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงมากกว่า 2 คำตอบ [O-NET 51/6]

1.  $(x - 2)^2 + 1 = 0$

2.  $(x^2 + 2)(x^2 - 1) = 0$

3.  $(x - 1)^2(x^2 + 2) = 0$

4.  $(x^2 - 1)(x + 2)^2 = 0$

6. ผลบวกของรากทั้งหมดของสมการ  $\frac{x-1}{x+2} + x = 1$  เท่ากับเท่าใด [O-NET 57/9]

7. ถ้าสมการ  $(x^2 + 1)(2x^2 - 6x + c) = 0$  มีรากที่เป็นจำนวนจริงเพียง 1 ราก ค่าของ  $c$  จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี [O-NET 54/7]

1.  $(0, 3)$

2.  $(3, 6)$

3.  $(6, 9)$

4.  $(9, 12)$

8. ถ้า  $\frac{3}{4}$  เป็นผลเฉลยหนึ่งของสมการ  $4x^2 + bx - 6 = 0$  เมื่อ  $b$  เป็นจำนวนจริงแล้ว อีกผลเฉลยหนึ่งของสมการนี้มีค่าเท่าใด [O-NET 53/6]

9. ถ้า  $x = -\frac{1}{2}$  เป็นรากของสมการ  $ax^2 + 3x - 1 = 0$  แล้ว รากอีกรากหนึ่งของสมการนี้มีค่าเท่าใด [O-NET 50/6]



10. ต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีพื้นที่ 65 ตารางวา โดยด้านยาวของที่ดินยาวกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 วา จะต้องใช้รั้วที่มีความยาวกี่วา [O-NET 52/21]

11. ถ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาว ยาวกว่า ด้านกว้างอยู่ 3 ฟุต และเส้นแทยงมุมยาวกว่าด้านกว้างอยู่ 7 ฟุต แล้ว เส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้ยาวกี่ฟุต [O-NET 56/11]

12. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีพื้นที่ 600 ตารางเซนติเมตร ถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่งยาวเป็น 75% ของด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งแล้ว เส้นรอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ ยาวกี่เซนติเมตร [O-NET 53/14]

13. โรงพิมพ์แห่งหนึ่งคิดค่าจ้างในการพิมพ์แผ่นพับแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นค่าเรียงพิมพ์ ซึ่งไม่ขึ้นกับจำนวนแผ่นพับที่พิมพ์ กับส่วนที่สองเป็นค่าพิมพ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นพับที่พิมพ์ โดยโรงพิมพ์เสนอราคา ดังนี้
- ถ้าสั่งพิมพ์ 100 ใบ จะคิดค่าจ้างรวมทั้งหมดเป็นเงิน 800 บาท  
และ ถ้าสั่งพิมพ์ 200 ใบ จะคิดค่าจ้างรวมทั้งหมดเป็นเงิน 1,100 บาท  
โรงพิมพ์คิดค่าเรียงพิมพ์กี่บาท [O-NET 56/35]
14. ห้องประชุมแห่งหนึ่งจัดที่นั่งเป็นแถวโดยนำโต๊ะมาเรียงต่อกันเป็นแถว แถวละ 5 ตัว หลังจากจัดแล้วได้ที่นั่งทั้งหมด 60 ที่นั่ง ถ้าจำนวนแถวน้อยกว่าจำนวนที่นั่งในแต่ละแถวอยู่ 4 ห้องประชุมนี้มีโต๊ะทั้งหมดกี่ตัว [O-NET 57/38]
15. แม่ค้านำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 1 กิโลกรัม ถั่วลิสง 3 กิโลกรัม และเมล็ดพิททอง 4 กิโลกรัม มาผสมกัน แล้วแบ่งใส่ถุง ถุงละ 100 กรัม ถ้าแม่ค้าซื้อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วลิสง และเมล็ดพิททองมาในราคา กิโลกรัมละ 250 บาท 50 บาท และ 100 บาท ตามลำดับแล้ว แม่ค้าจะต้องขายเมล็ดพิททองผสมถุงละ 100 กรัมนี้ ในราคา กี่บาท จึงจะได้กำไร 20 % เมื่อขายหมด [O-NET 51/37]

## สมบัติการไม่เท่ากัน

เมื่อก่อน เราเรียนสมบัติการเท่ากันมาแล้ว คราวนี้มาเรียนสมบัติการไม่เท่ากันบ้าง

- สมบัติการถ่ายทอด ถ้า  $a < b$  และ  $b < c$  แล้ว  $a < c$
- สมบัติการบวกด้วยตัวเท่า ถ้า  $a < b$  แล้ว  $a + c < b + c$
- สมบัติการคูณด้วยตัวเท่า
  - ถ้าคูณด้วยเลขบวก ได้เหมือนปกติ ถ้า  $a < b$  แล้ว  $5a < 5b$
  - ถ้าคูณด้วยเลขลบ ต้องกลับเครื่องหมาย ถ้า  $a < b$  แล้ว  $-5a > -5b$

สิ่งที่ต้องระวังคือ ห้าม คูณทั้งสองข้าง จนกว่าจะรู้ว่าตัวที่มาคูณเป็นบวกหรือลบ เพราะไม่รู้ว่าต้องกลับเครื่องหมายหรือไม่

เราสามารถนำสมการมาบวกกันได้

กล่าวคือ ถ้า  $a < b$  และ  $c < d$  แล้ว เราสามารถสรุปได้ว่า  $a + c < b + d$

แต่เราไม่สามารถนำสมการมาลบกันได้

เพราะ การลบ แฝงไว้ด้วยการคูณด้วยเลขลบ กล่าวคือ  $a - b = a + (-b)$  ทำให้ต้องกลับ  $> \leftrightarrow <$

ดังนั้น ถ้า  $a < b$  และ  $c < d$  แล้ว เราไม่สามารถสรุปได้ว่า  $a - c < b - d$

ถ้าอยากจะลบสมการ ให้แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ คูณ  $-1$  ก่อน แล้วค่อยเอาสมการมาบวกกัน

ตัวอย่าง กำหนดให้  $6 < a < 15$  และ  $1 < b < 4$  จงหาค่าที่เป็นไปได้ของ  $a - b$

วิธีทำ เราไม่สามารถนำสมการมาลบกันได้ ถ้าจะหา  $a - b$  ต้องคูณ  $-1$  แล้วนำสมการมาบวกกัน

$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} 6 < a < 15 \\ 1 < b < 4 \end{array} \longrightarrow -1 > -b > -4 \longrightarrow \begin{array}{l} 6 < a < 15 \\ -4 < -b < -1 \end{array} \\ \hline 5 < a - b < 11 \quad \times \\ \text{(ห้ามทำแบบนี้)} \end{array} \qquad \begin{array}{l} 6 < a < 15 \\ -4 < -b < -1 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} 6 < a < 15 \\ -4 < -b < -1 \end{array} \\ \hline 2 < a - b < 14 \quad \checkmark \end{array}$$

ดังนั้น ค่าที่เป็นไปได้ของ  $a - b$  คือ  $2 < a - b < 14$

#

การนำสมการมาคูณหรือหาร กัน ทำได้เมื่อมีทั้งสองสมการเป็นค่าบวก

กล่าวคือ ถ้า  $0 < a < b$  และ  $0 < c < d$  แล้ว เราสามารถสรุปได้ว่า  $ac < bd$

การนำสมการมาหารกัน ต้องแบ่งทำเป็น 2 ชั้น คือ กลับเศษเป็นส่วนก่อน แล้วค่อยเอาสมการมาคูณกัน

กล่าวคือ ถ้า  $0 < a < b$  และ  $0 < c < d$  แล้ว ห้ามสรุปว่า  $\frac{a}{c} < \frac{b}{d}$

$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} 0 < a < b \\ 0 < c < d \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} 0 < a < b \\ 0 < \frac{1}{d} < \frac{1}{c} \end{array} \\ \hline \frac{a}{c} < \frac{b}{d} \quad \times \\ \text{(ห้ามทำแบบนี้)} \end{array} \qquad \begin{array}{l} 0 < a < b \\ 0 < \frac{1}{d} < \frac{1}{c} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{l} 0 < a < b \\ \frac{a}{d} < \frac{b}{c} \end{array} \quad \checkmark$$

โจทย์ขอยอดนิยามในเรื่องนี้คือ โจทย์ข้อใดถูกข้อใดผิด

สิ่งที่ห้ามลืมคือ กฎที่เกี่ยวกับการคูณหารจำนวนมาก จะใช้ไม่ได้กับเลขลบ

ดังนั้น ก่อนจะตอบว่าข้อไหนถูก ลองแทนทั้งเลขบวกและเลขลบ ลงไปให้คลุมหลายๆกรณีดูก่อน

### แบบฝึกหัด

#### 1. ข้อใดถูกต้อง

1. ถ้า  $a < b$  แล้ว  $ab < b^2$

2. ถ้า  $a < b$  แล้ว  $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

3. ถ้า  $0 < a < b$  แล้ว  $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

4. ถ้า  $a < b < 0$  แล้ว  $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

5. ถ้า  $a < b$  แล้ว  $a^2 < b^2$

6. ถ้า  $a < b$  แล้ว  $ac < bc$

7. ถ้า  $0 < a < b$  แล้ว  $ac < bc$

8. ถ้า  $a < b < 0$  แล้ว  $ac > bc$

9. ถ้า  $a < b$  และ  $c > 0$  แล้ว  $ac < bc$

10. ถ้า  $a < b$  และ  $c < d$  แล้ว  $a - c < b - d$

11. ถ้า  $a < b$  และ  $c < d$  แล้ว  $ac < bd$

12. ถ้า  $a \neq b$  และ  $b \neq c$  แล้ว  $a \neq c$

13. ถ้า  $6 < a < 10$  และ  $2 < b < 4$  แล้ว  $4 < a - b < 6$

#### 2. กำหนดให้ $6 < a < 12$ และ $2 < b < 3$ จงหาว่าจำนวนต่อไปนี้ มีค่าอยู่ระหว่างจำนวนใด

1.  $a + b$

2.  $a - b$

3.  $ab$


4.  $\frac{a}{b}$

5.  $2a - 3b$

3. ให้  $a, b$  และ  $c$  เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อใดถูกต้องบ้าง [O-NET 56/1]
1. ถ้า  $ab = ac$  แล้วจะได้ว่า  $b = c$
  2. ถ้า  $a < b$  แล้วจะได้ว่า  $a^2 < b^2$
  3. ถ้า  $a < b$  และ  $b < c$  แล้วจะได้ว่า  $ab < bc$
4. กำหนดให้  $s, t, u$  และ  $v$  เป็นจำนวนจริง ซึ่ง  $s < t$  และ  $u < v$  ข้อใดถูกต้องบ้าง [O-NET 53/4]
1.  $s - u < t - v$
  2.  $s - v < t - u$
5. กำหนดให้ค่าประมาณที่ถูกต้องถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ของ  $\sqrt{3}$  และ  $\sqrt{5}$  คือ 1.732 และ 2.236 ตามลำดับ ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้องบ้าง [O-NET 52/3]
1.  $2.235 + 1.731 \leq \sqrt{5} + \sqrt{3} \leq 2.237 + 1.733$
  2.  $2.235 - 1.731 \leq \sqrt{5} - \sqrt{3} \leq 2.237 - 1.733$
6. ให้  $a = \sqrt{18} - \sqrt{12}$  และ  $b = \sqrt{75} - \sqrt{50}$  ข้อใดถูกต้องบ้าง [O-NET 57/3]
1.  $a$  และ  $b$  เป็นจำนวนอตรรกยะ
  2.  $3a < 2b$
  3.  $a + b < 2$


ช่วง

“ช่วง” คือ เซตของจำนวนทุกจำนวนที่มีค่า ตั้งแต่ / ระหว่าง จำนวนที่ระบุ โดยจะมีระบบสัญลักษณ์ ดังนี้




เช่น	$[1, 5]$	ทุกจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 5 (รวม 1 กับ 5 ด้วย)	$\{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$
	$[-4, 3)$	ทุกจำนวนตั้งแต่ -4 ถึง 3 (รวม -4 แต่ไม่เอา 3)	$\{x \mid -4 \leq x < 3\}$
	$(2, \infty)$	ทุกจำนวนที่มากกว่า 2 (ไม่รวม 2)	$\{x \mid 2 < x\}$
	$(-\infty, -2]$	ทุกจำนวนตั้งแต่ -2 ลงไป (รวม -2 ด้วย)	$\{x \mid x \leq -2\}$

นอกจากนี้ เรายังใช้แผนภาพเส้นจำนวน เพื่อแสดงช่วง ได้ด้วย



เนื่องจากช่วง เป็น “เซต” ของจำนวน ดังนั้น เราจะใช้เครื่องหมาย  $\in, \subset, \cup, \cap, -, '$  ได้เหมือนเรื่องเซต ในกรณีที่โจทย์มีความซับซ้อน เราอาจวาดรูปเส้นจำนวน เพื่อช่วยคิด

เช่น	$2 \in (0, 5)$	$6 \notin (-\infty, 2]$
	$\{2\} \subset (0, 5)$	$(1, 3] \subset (-\infty, 3]$



$(-\infty, 2] - \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, 2]$        $(2, \infty)' = (-\infty, 2]$   
 $\{1\}' = (-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

แบบฝึกหัด

1. จงหาผลลัพธ์ของช่วงต่อไปนี้
  1.  $(1, 10) \cup (-1, 2]$
  2.  $(-\infty, 2) \cup (-1, 0]$

3.  $(-3, 3) \cap (-1, 1]$

4.  $(-\infty, -2) \cap (1, \infty)$

5.  $(-\frac{1}{2}, 2) \cup (-\frac{1}{3}, 3) \cup (-\frac{1}{4}, 4)$

6.  $(-\frac{1}{2}, 2) \cap (-\frac{1}{3}, 3) \cap (-\frac{1}{4}, 4)$

7.  $(-\infty, 5) - (-1, 5]$

8.  $[2, \infty) - (-1, 2)$

9.  $[-8, 8) - [-1, 1)$

10.  $[5, 8)'$

2. จงเขียนช่วงที่สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้

1.  $-1 \leq x < 9$

2.  $x > 1$

3.  $x \leq -3$

4.  $x > -1$  และ  $x \leq 1$

5.  $x < -2$  หรือ  $x > 2$

6.  $x > -2$  หรือ  $x < 2$

7.  $x \neq 2$

8.  $x \geq -4$  และ  $x \neq 2$

อสมการตัวแปรเดียว

การแก้สมการ คือ การหาค่าที่เมื่อแทนในตัวแปรแล้วทำให้สมการเป็นจริง

อสมการ จะต่างจาก สมการ ตรงที่ มีคำตอบเยอะแยะไปหมด ที่แทนแล้วอสมการเป็นจริง

เช่น อสมการ  $3x \geq 6$  จะเห็นว่า แทน  $x$  ด้วย 10 ก็ทำให้อสมการเป็นจริง

แทน  $x$  ด้วย 55 ก็ทำให้อสมการเป็นจริง

แทน  $x$  ด้วย 2 ก็ทำให้อสมการเป็นจริง

แทน  $x$  ด้วย 2.5 ก็ทำให้อสมการเป็นจริง

ดังนั้น คำตอบของอสมการนี้คือ “ทุกจำนวนตั้งแต่ 2 ขึ้นไป”

ในการแก้สมการ สิ่งที่ต้องระวังคือ เมื่อคูณหรือหารทั้ง 2 ข้างด้วยเลขลบ ต้องกลับ  $>$  เป็น  $<$  และ  $\geq$  เป็น  $\leq$   
การย้ายข้างก็ด้วย ถ้าย้ายเลขลบ จากคูณไปเป็นหาร (หรือจากหารไปเป็นคูณ) ก็ต้องกลับเครื่องหมาย เหมือนกัน

เช่น	$x > 3$	$-3x < 6$
	$-2x < (3)(-2)$	$x > \frac{6}{-3}$
		$-\frac{x}{2} \leq 5$
		$x \geq (5)(-2)$

แต่	$-4x < -8$	$x - 2 > 8$
	$-x < \frac{-8}{4}$	$x > 8 + 2$
	ไม่ต้องกลับเครื่องหมาย	ย้ายแบบ บวก $\leftrightarrow$ ลบ
	เพราะย้าย 4 ซึ่งเป็นบวก	ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย
		$\frac{x+2}{x} > 5$
		$x + 2 \geq 5x$
		ห้ามทำ! เพราะไม่รู้
		ว่า $x$ เป็นบวกหรือลบ

การแก้สมการดีกรี 1 ใช้หลักเดียวกับเรื่องสมการ แต่ต้องระวังตอนย้ายเลขลบแบบคูณหาร

เช่น	$2x + 3 \geq 4x - 5$	
	$2x - 4x \geq -5 - 3$	
	$-2x \geq -8$	
	$x \leq \frac{-8}{-2}$	กลับ $\geq$ เป็น $\leq$ ด้วย
	$x \leq 4$	ดังนั้น เซตคำตอบคือ $(-\infty, 4]$

ในกรณีที่ แต่ละพจน์ในอสมการตัดกันแล้ว “ $x$  หายหมด” ให้ดูตัวเลขที่เหลือ ว่าทำให้ประโยคเป็นจริงหรือไม่

- ถ้าตัวเลขที่เหลือทำให้อสมการเป็นจริง อสมการนี้จะมีคำตอบเป็นอะไรก็ได้ เซตคำตอบคือ  $(-\infty, \infty)$
- ถ้าตัวเลขที่เหลือทำให้อสมการเป็นเท็จ อสมการนี้จะไม่มีความหมาย เซตคำตอบคือ  $\emptyset$

เช่น	$x - 5 \leq x - 3$	$4 - 2x > -2x + 5$
	$-5 \leq -3$ จริง	$4 > 5$ ไม่จริง
	เซตคำตอบ คือ $(-\infty, \infty)$	เซตคำตอบ คือ $\emptyset$

บางที โจทย์อาจนำอสมการหลายๆท่อนมาต่อกัน เช่น  $2x - 4 < 2 - x < 2x + 14$

ในกรณีนี้ เราจะใช้หลัก บวกลบคูณหาร “ทุกท่อน” ด้วยตัวเท่า เพื่อรวม  $x$  ไปไว้ที่เดียว

เช่น	$2x - 4 < 2 - x < 2x + 14$	
	$2x - 4 - 2x < 2 - x - 2x < 2x + 14 - 2x$	ลบ $2x$ ตลอดทุกท่อน
	$-4 < 2 - 3x < 14$	
	$-4 - 2 < 2 - 3x - 2 < 14 - 2$	ลบ 2 ตลอดทุกท่อน
	$-6 < -3x < 12$	
	$\frac{-6}{-3} > \frac{-3x}{-3} > \frac{12}{-3}$	หาร $-3$ ตลอดทุกท่อน (กลับเครื่องหมายด้วย)
	$2 > x > -4$	ดังนั้น เซตคำตอบคือ $(-4, 2)$



อีกวิธีที่จะแก้สมการหลายท่อน คือ แยกสมการออกเป็นสมการย่อยๆ แล้วเอาคำตอบทุกคำตอบมาหาส่วนร่วม

เช่น  $2x - 4 < 2 - x < 2x + 14$

$$2x - 4 < 2 - x$$

$$2x + x < 2 + 4$$

$$3x < 6$$

$$x < 2$$


และ

$$2 - x < 2x + 14$$

$$-x - 2x < 14 - 2$$

$$-3x < 12$$

$$x > -4$$



แบบฝึกหัด

1. จงแก้สมการต่อไปนี้

1.  $-3 < 2x - 1 \leq 3$

2.  $-1 \leq 1 - \frac{4+2x}{3} \leq 3$

3.  $x - 1 \leq 2x + 1 < 5$

4.  $x - 2 < 1 - 2x < x + 4$

การแก้อสมการตั้งแต่ดีกรี 2 ขึ้นไป จะทำคล้ายๆกับเรื่องสมการ คือให้จัดฝั่งหนึ่งเป็น 0


อีกฝั่งให้แยกตัวประกอบ ให้อยู่ในรูปการคูณ “หรือหาร” กันของวงเล็บของ  $x$  แล้วจับให้แต่ละวงเล็บเป็น 0 แก้หาค่า  $x$  ถ้าเป็นเมื่อก่อนในเรื่องสมการ เราจะนำค่า  $x$  ที่ได้ไปตอบ แต่ในเรื่องอสมการ เราจะนำค่า  $x$  ที่ได้ไปพล็อตบนเส้นจำนวน โดยค่า  $x$  ที่ได้ จะแบ่งเส้นจำนวนออกเป็นหลายๆช่องๆ จากนั้น ช่องขวาสุด ให้ใส่เครื่องหมาย + ลงไป

และในช่องทางซ้ายถัดๆมา ให้ใส่เครื่องหมาย  $- , + , - , + , \dots$  สลับไปเรื่อยๆจนครบ

- ถ้าเครื่องหมายของอสมการคือ  $> 0$  ให้นำช่วงที่มีเครื่องหมาย + ไปตอบ
- ถ้าเครื่องหมายของอสมการคือ  $< 0$  ให้นำช่วงที่มีเครื่องหมาย - ไปตอบ


เช่น

$$\begin{aligned} x^2 + x - 6 &< 0 \\ (x - 2)(x + 3) &< 0 \end{aligned}$$




เซตคำตอบ คือ  $(-3, 2)$

$$\begin{aligned} x^2 - 4x - 5 &> 0 \\ (x + 1)(x - 5) &> 0 \end{aligned}$$




เซตคำตอบ คือ  $(-\infty, -1) \cup (5, \infty)$

$$\frac{(x-2)}{(x+3)} < 0$$




เซตคำตอบ คือ  $(-3, 2)$

$$(x + 1)(x - 2)(x + 3) < 0$$



เซตคำตอบ คือ  $(-\infty, -3) \cup (-1, 2)$

$$\frac{(x+1)(x-2)}{(x+3)(x-5)} > 0$$



เซตคำตอบ คือ  $(-\infty, -3) \cup (-1, 2) \cup (5, \infty)$

แบบฝึกหัด

2. จงแก้อสมการต่อไปนี้

1.  $x^2 - 5x + 6 < 0$

2.  $x^2 + 7x + 12 > 0$

3.  $x^2 - 4 > 0$


4.  $\frac{1}{x+2} < \frac{1}{x+1}$

ในกรณีที่ เป็น  $\geq$  หรือ  $\leq$  ให้ทำเหมือนเดิม แต่ให้รวมจุดบนเส้นจำนวนไปในคำตอบด้วย

พุดง่าย ๆ คือ ให้ใช้ จุดทึบ  $\bullet$  แทนที่จะเป็นจุดกลวง  $\circ$  เหมือนก่อน ยกเว้น ตัวที่มาจาก “ส่วน” ห้ามใช้จุดทึบ


เช่น

$$\begin{aligned} x^2 + x - 6 &\leq 0 \\ (x - 2)(x + 3) &\leq 0 \end{aligned}$$



เซตคำตอบ คือ  $[-3, 2]$

$$\frac{(x-2)(x+3)}{(x+1)(x-5)} \geq 0$$



เซตคำตอบ คือ  $(-\infty, -3] \cup (-1, 2] \cup (5, \infty)$

### แบบฝึกหัด

3. จงแก้สมการต่อไปนี้

1.  $2x^2 - 3x - 2 \leq 0$

2.  $6x^2 + 5x - 1 \geq 0$

3.  $x(2x - 1) \geq 15$



4.  $3x^3 + 2x^2 - 3x - 2 \leq 0$

5.  $\frac{3x-5}{x+1} \geq 0$

6.  $\frac{3x-5}{x+1} \geq 1$

ในกรณีที่  $n$  เป็นเลขคู่ (วงเล็บ) ยกกำลังคู่ อยู่ตอนที่สลับ  $+ - + \dots$  ให้ไม่ต้องสลับตรงจุดที่มาจาก (วงเล็บ) ยกกำลังคู่ โดยให้ใช้เครื่องหมายเดิมเดียวกับช่องทางขวา

เช่น



แบบฝึกหัด

4. จงแก้สมการต่อไปนี้

1.  $(x + 1)^3(x - 2)^4(x + 3)^5 < 0$

2.  $\frac{(x-1)^2(x-2)}{x+1} \geq 0$

3.  $(x^2 - 1)(x + 1) \geq 0$

4.  $\frac{(x-1)^4(x-2)^3}{(x-3)^2(x-4)} \geq 0$

ในกรณีที่  $x$  ตัวซ้ายสุด (ที่ยกกำลังสูงสุด) มีเลขลบคูณอยู่ ให้จัดรูปใหม่ให้เป็นบวก โดยการคูณ  $-1$  ทั้งสองข้าง แล้วสลับเครื่องหมาย มากกว่า  $\leftrightarrow$  น้อยกว่า

เช่น  $-2x^2 + 3x + 2 \leq 0 \quad \rightarrow \quad 2x^2 - 3x - 2 \geq 0$

$(-x + 2)(x + 1) > 0 \quad \rightarrow \quad (x - 2)(x + 1) < 0$

$(-x + 2)(-x + 1) > 0 \quad \rightarrow \quad (x - 2)(x - 1) > 0$  (คูณ  $-1$  สองครั้ง)

$(-x + 2)^4(-x + 1) > 0 \quad \rightarrow \quad (x - 2)^4(x - 1) < 0$  (ยกกำลังคู่  $(-x + 2)^4 = (x - 2)^4$ )

แบบฝึกหัด

5. จงแก้สมการต่อไปนี้

1.  $4 - x^2 \geq 0$

2.  $\frac{(x-1)(x+2)}{2-x} \geq 0$

3.  $\frac{(3-x)^2(1-2x)}{(-x-2)(x+1)} \leq 0$

4.  $\frac{(1-x)^4(2-x)^3}{(3-x)^2(x-4)} > 0$

และในกรณีที่มีตัวที่แยกตัวประกอบไม่ได้ (เช่น  $x^2 + 1$ ) ตัวเหล่านี้จะเป็นบวกเสมอ จึงย้ายข้างแบบคูณหารได้ โดยไม่ต้องระวังเรื่องการสลับเครื่องหมาย มากกว่า  $\leftrightarrow$  น้อยกว่า

เช่น  $(x^2 + 1)(x - 3)(x + 1) > 0 \rightarrow$  เอา  $x^2 + 1$  หารตลอดได้

เพราะ  $x^2 + 1$  เป็นบวกเสมอ ไม่ต้องกลับมากกว่าเป็นน้อยกว่า

เหลือ  $(x - 3)(x + 1) > 0$  เป็นต้น

แบบฝึกหัด

6. จงแก้สมการต่อไปนี้

1.  $\frac{3x-5}{x^2+5} \geq 0$

2.  $\frac{x^3-x^2+x-1}{x-2} \geq 0$

3.  $x^2 + 4 > 0$

4.  $x^2 + 4 \leq 0$

7. เซตคำตอบของอสมการ  $-1 \leq \sqrt{2} + \frac{x}{1-\sqrt{2}} \leq 1$  คือเซตในข้อใดต่อไปนี้ [O-NET 51/4]

1.  $[\sqrt{2} - 1, 1]$       2.  $[\sqrt{2} - 1, 2]$       3.  $[3 - 2\sqrt{2}, 1]$       4.  $[3 - 2\sqrt{2}, 2]$

8. ให้  $A = \{x \mid (2x + 1)(4 - 3x) > 0\}$  ข้อใดเป็นเซตย่อยของ  $A$  [O-NET 56/6]

1.  $(-1.2, -0.2)$       2.  $(-0.9, 0.3)$       3.  $(-0.6, 1.2)$   
4.  $(0.4, 1.5)$       5.  $(0.3, 1.3)$

9. เซตของจำนวนจริง  $m$  ซึ่งทำให้สมการ  $x^2 - mx + 4 = 0$  มีรากเป็นจำนวนจริง เป็นสับเซตของเซตใดต่อไปนี้ [O-NET 50/26]
1.  $(-5, 5)$
  2.  $(-\infty, -4) \cup [3, \infty)$
  3.  $(-\infty, 0) \cup [5, \infty)$
  4.  $(-\infty, -3) \cup [4, \infty)$
10. พี่มีเงินมากกว่าน้อง 120 บาท ถ้าทั้งสองคนมีเงินรวมกันไม่เกิน 1,240 บาท แล้ว พี่มีเงินมากที่สุดได้กี่บาท [O-NET 56/36]
11. แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวชามละ 25 บาท โดยมีค่าเช่าร้านวันละ 120 บาท และต้นทุนค่าวัตถุดิบทั้งหมดคิดเป็นชามละ 18 บาท ถ้าต้องการให้ได้กำไรไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท เขาต้องขายให้ได้อย่างน้อยวันละกี่ชาม [O-NET 57/37]

## ค่าสัมบูรณ์

“ค่าสัมบูรณ์” ของ  $x$  แทนด้วยสัญลักษณ์  $|x|$  หมายถึง “ค่าที่เป็นบวก” ของ  $x$

เช่น  $|-2| = 2$  ,  $|5| = 5$  ,  $|-\sqrt{3}| = \sqrt{3}$

สูตรสำหรับหา  $|x|$  จะเป็นดังนี้

$$|x| = \begin{cases} x & \text{เมื่อ } x \geq 0 \\ -x & \text{เมื่อ } x < 0 \end{cases}$$

ถ้า  $x$  เป็นบวกอยู่แล้ว  $|x|$  จะได้เท่าเดิม  
ถ้า  $x$  เป็นลบอยู่ จะถูกทำให้เป็นบวกโดยคูณลบเข้าไป (ใช้หลักว่าลบคูณลบได้บวก)

สมบัติที่สำคัญของค่าสัมบูรณ์ คือ

- การยกกำลังสอง กำจัดเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ได้ กล่าวคือ  $|x|^2 = x^2$
- กระจายในคูณหารได้  $|xy| = |x||y|$   $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$
- แต่กระจายในบวกลบไม่ได้  $|x + y| \neq |x| + |y|$   $|x - y| \neq |x| - |y|$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$  เสมอ
- $\sqrt{x^2} = |x|$

เวลาทำโจทย์ประเภท ข้อใดถูกข้อใดผิด ให้ระวังเรื่องเลขบวกเลขลบให้ดี

ในบางที่ เราอาจต้องแบ่งคิดเป็นสองกรณี คือ กรณีที่  $x \geq 0$  กับกรณีที่  $x < 0$

## แบบฝึกหัด

1. ข้อใดถูกต้อง

1.  $a < |a|$

2.  $a|b| = |a|b$

3.  $\frac{|a|}{a} = \frac{a}{|a|}$

4.  $(a - |a|)^2 \leq 4a^2$

5. ถ้า  $a < b$  แล้ว  $|a| < |b|$

6. ถ้า  $|a| < |b|$  แล้ว  $a < b$

7. ถ้า  $|a| < |b|$  แล้ว  $a^2 < b^2$

8. ถ้า  $a \leq b$  แล้ว  $a|c| \leq b|c|$

9.  $|2 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3}$

10. ถ้า  $x < 2$  แล้ว  $|x - 2| = 2 - x$

11. ถ้า  $a \neq b$  แล้ว  $|a| \neq |b|$

12. ถ้า  $|a| > |b|$  แล้ว  $|ac| > |bc|$

13.  $|x^n| = |x|^n$

14.  $\sqrt{x^2} = -x$  เมื่อ  $x < 0$

15.  $|a - b| = |b - a|$

16.  $\frac{x}{|x|} \in \{-1, 1\}$  เมื่อ  $x \neq 0$

17.  $x|x| \leq x^2$



2. กำหนดให้  $x > 1$  จงหาเซตคำตอบของอสมการ  $|1 - x| < 2$
3. กำหนดให้  $a, b$  เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูก [O-NET 49/1-17]
1. ถ้า  $a < b$  แล้ว จะได้  $a^2 < b^2$
  2. ถ้า  $a < b < 0$  แล้ว จะได้  $ab < a^2$
  3. ถ้า  $|a| < |b|$  แล้ว จะได้  $a < b$
  4. ถ้า  $a^2 < b^2$  แล้ว จะได้  $a < b$
4. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [O-NET 54/5]
1. ถ้า  $a$  และ  $b$  เป็นจำนวนจริงซึ่ง  $|a| < |b|$  แล้ว  $a^3 < b^3$
  2. ถ้า  $a, b$  และ  $c$  เป็นจำนวนจริงซึ่ง  $ac = bc$  แล้ว  $a = b$
5. กำหนดให้  $a, b$  และ  $c$  เป็นจำนวนจริงซึ่ง  $|a|b^3c > 0$  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องบ้าง [O-NET 54/6]
1.  $ac > 0$
  2.  $bc > 0$
6. กำหนดให้  $a, b$  และ  $c$  เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อใดถูกต้องบ้าง [O-NET 57/1]
1. ถ้า  $ab = ac$  แล้ว  $b = c$
  2. ถ้า  $a|bc| < 0$  และ  $b < 0$  แล้ว  $|ab|c < 0$
  3. ถ้า  $a > 0$  และ  $b > 0$  แล้ว  $a + b \geq \sqrt{2ab}$

7. ถ้า  $x \leq 5$  แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก [O-NET 50/4]

1.  $x^2 \leq 25$

2.  $|x| \leq 5$

3.  $x|x| \leq 25$

4.  $(x - |x|)^2 \leq 25$

8. จำนวนสมาชิกของเซต  $\left\{x \mid x = \left(a + \frac{1}{|a|}\right)^2 - \left(|a| - \frac{1}{a}\right)^2 \text{ เมื่อ } a \text{ เป็นจำนวนจริงซึ่งไม่เท่ากับ } 0\right\}$  เท่ากับเท่าใด [O-NET 51/21]

9. ถ้าช่วงเปิด  $(a, b)$  เป็นเซตคำตอบของสมการ  $|x - 1| + |6 - 3x| < 17$  และ  $x > 2$  แล้ว  $a + b$  เท่ากับเท่าใด [O-NET 54/27]

## สมการ อสมการ ค่าสัมบูรณ์

หลักในการแก้ คือ ต้องกำจัดเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ออกไปให้ได้ ซึ่งมีวิธีดังนี้

1. สมการในรูป  $|ax + b| = c$  แปลว่า  $ax + b = c$  หรือ  $ax + b = -c$   
และคำตอบต้องทำให้  $c \geq 0$

ตัวอย่าง จงหาเซตคำตอบของสมการ  $|x^2 + 2x - 1| = 2$

วิธีทำ จะได้  $x^2 + 2x - 1 = 2$  หรือ  $x^2 + 2x - 1 = -2$  และคำตอบต้องทำให้  $2 \geq 0$   
 $x^2 + 2x - 3 = 0$                        $x^2 + 2x + 1 = 0$                       ยังไงก็จริง  
 $(x - 1)(x + 3) = 0$                        $(x + 1)^2 = 0$                       ดังนั้น ใช้ได้ทุกคำตอบ  
 $x = 1, -3$                                        $x = -1$

ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $\{-3, -1, 1\}$

#

ตัวอย่าง จงหาเซตคำตอบของสมการ  $|x| = 3x + 4$

วิธีทำ จะได้  $x = 3x + 4$  หรือ  $x = -(3x + 4)$  และคำตอบต้องทำให้  $3x + 4 \geq 0$   
 $-2x = 4$                                        $x = -3x - 4$   
 $x = -2$                                        $4x = -4$   
 $x = -1$

แต่คำตอบ ต้องทำให้  $3x + 4 \geq 0$ :  $3(-2) + 4 = -2 \geq 0$  ไม่จริง

$3(-1) + 4 = 1 \geq 0$  จริง

ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $\{-1\}$

#

ตัวอย่าง จงหาเซตคำตอบของสมการ  $|2x - 1| = -3$

วิธีทำ จะได้  $2x - 1 = -3$  หรือ  $2x - 1 = 3$  และคำตอบต้องทำให้  $-3 \geq 0$

ยังก็ไม่จริง

ดังนั้น ใช้ไม่ได้ทุกคำตอบ

ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $\emptyset$

#

2. อสมการในรูป  $|ax + b| < c$  แปลว่า  $-c < ax + b < c$   
และคำตอบต้องทำให้  $c > 0$

ตัวอย่าง จงหาเซตคำตอบของอสมการ  $|3 - 2x| \leq 5$

วิธีทำ จะได้  $-5 \leq 3 - 2x \leq 5$  และคำตอบต้องทำให้  $5 \geq 0$

$-8 \leq -2x \leq 2$                       ยังไงก็จริง

$4 \geq x \geq -1$

ดังนั้น ใช้ได้ทุกคำตอบ

ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $[-1, 4]$

#

**ตัวอย่าง** จงหาเซตคำตอบของอสมการ  $|5 - 2x| < x - 1$


**วิธีทำ** จะได้  $-(x - 1) < 5 - 2x < x - 1$  และคำตอบต้องทำให้  $x - 1 > 0$

$$\begin{aligned} -(x - 1) < 5 - 2x \\ -x + 1 < 5 - 2x \\ x < 4 \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} 5 - 2x < x - 1 \\ 6 < 3x \\ 2 < x \end{aligned}$$

$$x > 1$$



ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $(\infty, 4) \cap (2, \infty) \cap (1, \infty) = (2, 4)$

#

**ตัวอย่าง** จงหาเซตคำตอบของอสมการ  $|x + 1| \leq -1$

**วิธีทำ** จะได้  $-1 < x + 1 < 1$  และคำตอบต้องทำให้  $-1 > 0$

ยังงี้ก็ไม่จริง

ดังนั้น ใช้ไม่ได้ทุกคำตอบ

ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $\emptyset$

#

3. อสมการในรูป  $|ax + b| > c$  แปลว่า  $ax + b > c$  หรือ  $ax + b < -c$

**ตัวอย่าง** จงแก้สมการ  $|x + 2| \geq x + 4$

**วิธีทำ** จะได้  $x + 2 \geq x + 4$  หรือ  $x + 2 \leq -(x + 4)$

$$\begin{aligned} 2 &\geq 4 & x + 2 &\leq -x - 4 \\ \text{ไม่มีคำตอบ} & & 2x &\leq -6 \\ & & x &\leq -3 \end{aligned}$$


ดังนั้น เซตคำตอบคือ  $(-\infty, -3]$

#

**ตัวอย่าง** จงแก้สมการ  $\left|\frac{x-1}{3}\right| > 2$

**วิธีทำ** จะได้  $\frac{x-1}{3} > 2$  หรือ  $\frac{x-1}{3} < -2$

$$\begin{aligned} x - 1 &> 6 & x - 1 &< -6 \\ x &> 7 & x &< -5 \end{aligned}$$



ดังนั้น เซตคำตอบคือ  $(-\infty, -5) \cup (7, \infty)$

#

4. ประโยคในรูป  $|ax + b| = |cx + d|$  ,  $|ax + b| > |cx + d|$  ,  $|ax + b| < |cx + d|$


ให้กำจัดเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์โดยการยกกำลังสองทั้งสองข้าง ( $|x|^2 = x^2$ )

แล้วย้ายข้างมาเข้าสูตร  $n^2 - l^2 = (n - l)(n + l)$

**ตัวอย่าง** จงแก้สมการ  $|2 - 3x| \geq |x - 4|$

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} & & |2 - 3x|^2 &\geq |x - 4|^2 \\ & & (2 - 3x)^2 &\geq (x - 4)^2 \\ & & (2 - 3x)^2 - (x - 4)^2 &\geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ((2 - 3x) - (x - 4))((2 - 3x) + (x - 4)) &\geq 0 \\ (2 - 3x - x + 4)(2 - 3x + x - 4) &\geq 0 \\ (-4x + 6)(-2x - 2) &\geq 0 \\ (-2x + 3)(-x - 1) &\geq 0 \end{aligned}$$



ดังนั้น เซตคำตอบคือ  $(-\infty, -1] \cup [\frac{3}{2}, \infty)$

#

ตัวอย่าง จงแก้สมการ  $|x^2 - 4x - 5| = |x^2 - 3x + 8|$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} |x^2 - 4x - 5|^2 &= |x^2 - 3x + 8|^2 \\ (x^2 - 4x - 5)^2 &= (x^2 - 3x + 8)^2 \\ (x^2 - 4x - 5)^2 - (x^2 - 3x + 8)^2 &= 0 \\ ((x^2 - 4x - 5) - (x^2 - 3x + 8))((x^2 - 4x - 5) + (x^2 - 3x + 8)) &= 0 \\ (x^2 - 4x - 5 - x^2 + 3x - 8)(x^2 - 4x - 5 + x^2 - 3x + 8) &= 0 \\ (-x - 13)(2x^2 - 7x + 3) &= 0 \\ (-x - 13)(2x - 1)(x - 3) &= 0 \\ x &= -13, \frac{1}{2}, 3 \end{aligned}$$

ดังนั้น เซตคำตอบ คือ  $\{-13, \frac{1}{2}, 3\}$

#

สรุป: รูปแบบการแก้ สมการ / อสมการ ค่าสัมบูรณ์ มีดังนี้

	เปลี่ยนเป็นรูปที่ไม่มีค่าสัมบูรณ์	หมายเหตุ
$ a  = b$	$a = b$ หรือ $a = -b$	คำตอบ ต้องทำให้ $b \geq 0$
$ a  < b$	$-b < a < b$	คำตอบ ต้องทำให้ $b > 0$
$ a  > b$	$a > b$ หรือ $a < -b$	
$ a  =  b $ $ a  <  b $ $ a  >  b $	ยกกำลังสองทั้งสองข้าง เพื่อกำจัดค่าสัมบูรณ์ โดยใช้หลัก $ x ^2 = x^2$	

แบบฝึกหัด

1. จงแก้สมการ / อสมการ ต่อไปนี้

1.  $|x + 2| = 5$

2.  $|2x - 1| = -1$

3.  $x^2 + 4 = 4|x|$

4.  $|2x + 5| \leq 3$

5.  $|x^2 + 4| > 5$

6.  $|2x| > x + 6$

7.  $|x + 3| < 2x$

8.  $|3x - 4| \leq 2x - 1$

9.  $|x - 3| \leq 5 - x$

10.  $|2x - 1| \geq x - 2$

11.  $|2x + 1| \geq |x + 2|$

12.  $|x^2 - 5x + 1| < |x^2 - 4x + 3|$

13.  $|x^2 - 3x - 8| = x^2 + 3x$

14.  $|1 - 3|1 - 3x|| = x$

2. พิจารณาสมการ  $|x - 7| = 6$  ข้อสรุปใดต่อไปนี้เป็นเท็จ [O-NET 52/6]

1. คำตอบหนึ่งของสมการมีค่าระหว่าง 10 และ 15
2. ผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการมีค่าเท่ากับ 14
3. สมการนี้มีคำตอบมากกว่า 2 คำตอบ
4. ในบรรดาคำตอบทั้งหมดของสมการ คำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดมีค่าน้อยกว่า 3

3. ผลเฉลยของสมการ  $2|5 - x| = 1$  อยู่ในช่วงใด [O-NET 53/5]

1.  $(-10, -5)$
2.  $(-6, -4)$
3.  $(-4, 5)$
4.  $(-3, 6)$

4. ผลบวกของคำตอบทุกคำตอบของสมการ  $x^3 - 2x = |x|$  เท่ากับเท่าใด [O-NET 51/24]

5. จำนวนเต็มที่สุดคดคล้องกับอสมการ  $|x - 3| \leq 4$  มีกี่จำนวน [O-NET 56/33]

6. ถ้า  $A = \{x \mid |x + 1| + 1 > 2\}$  แล้ว ช่วงในข้อใดเป็นสับเซตของ  $A$  [O-NET 57/10]

1.  $(-4, -2]$     2.  $(-3, -1)$     3.  $[-1, 0)$     4.  $[0, 2)$     5.  $[2, 3)$

7. กำหนดให้  $A = \{x \mid |x - 2| < 3\}$  และ  $B = \{x \mid x^2 - 3x - 4 > 0\}$   
สมาชิกของ  $A - B$  ที่เป็นจำนวนเต็มมีกี่ตัว [O-NET 57/11]

8. กำหนดให้  $I$  เป็นเซตของจำนวนเต็ม และ  $A = \left\{x \in I \mid \frac{|x-1|-1}{|x-1|} \leq \frac{2}{3}\right\}$   
จำนวนสมาชิกของเซต  $A$  เท่ากับเท่าใด [O-NET 49/1-20]



## จำนวนชนิดต่างๆ

- 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21
- 1
  - ไม่มี
  - 4
  - ไม่มี
  - 1
  - ไม่มี
  - ไม่มี
  - ไม่มี
- $A < C < B$ 
  - 1
  - 1, 2
  - 1
- 1
  -

## สมบัติการเท่ากัน

- สะท้อน
  - บวกตัวเท่า
  - สมมาตร
  - ถ่ายทอด
  - คูณตัวเท่า
  - ถ่ายทอด
  - บวกตัวเท่า
  - คูณตัวเท่า
  - บวกตัวเท่า
  - สะท้อน
  - คูณตัวเท่า
  - สมมาตร
- บวกตัวเท่า
  - บวกตัวเท่า
  - คูณตัวเท่า
  - สมมาตร

## สมบัติการบวกและคูณ

- +, ×
  - ×
  - +, ×
  - +, ×
  - +
  - +, ×
  - +, ×
  - ไม่ปิด
- 2, 4, 5
- 8
  - $\frac{1}{2}$
  - $-\frac{1}{2}$
  - $-\frac{1}{2}$
  - 0
  - 1
  - 1
  - $\frac{\sqrt{2}}{2}$
  - $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
  - $\frac{x+1}{x}$
- 1

## พหุนาม

- 5
- $2x^2 + 3x - 2$
- $2x^3 + 3x^2 - x - 4$
- 3
- 15
- 8
- 9

จาก  $(P(x))^2$  เท่ากับ  $x^2 + 6x + c$  จะได้ว่า  $(P(x))^2$  เป็นพหุนามกำลัง 2

ดังนั้น  $P(x)$  ต้องเป็นพหุนามกำลัง 1  $\rightarrow$  ให้  $P(x) = ax + k$  (ตัวแปร  $c$  ถูกใจทยอยใช้ไปแล้ว)

$$\begin{aligned}
 (P(x))^2 &= x^2 + 6x + c \\
 (ax + k)^2 &= x^2 + 6x + c \\
 (ax + k)(ax + k) &= x^2 + 6x + c \\
 a^2x^2 + akx + akx + k^2 &= x^2 + 6x + c \\
 a^2x^2 + 2akx + k^2 &= x^2 + 6x + c
 \end{aligned}$$

เทียบ สปส จะได้

$$\begin{aligned}
 a^2 &= 1 \\
 2ak &= 6 \\
 k^2 &= c
 \end{aligned}$$

8. 10

จาก  $P(x) = (x^2 + 1)Q(x)$  พิจารณาดีกรีของพหุนาม จะได้ว่า  $Q(x)$  ต้องเป็นพหุนามกำลัง 1  
 พหุนามกำลัง 3      พหุนามกำลัง 2  
 ให้  $Q(x) = cx + d$

ดังนั้น  $P(x) = (x^2 + 1)Q(x)$   
 $2x^3 + ax^2 + bx + 3 = (x^2 + 1)(cx + d)$   
 $2x^3 + ax^2 + bx + 3 = cx^3 + dx^2 + cx + d$

เทียบ สปส จะได้  $2 = c$   
 $a = d$   
 $b = c$   
 $3 = d$

9. 2

การแยกตัวประกอบพหุนาม

- |  |   |
|--|---|
| 1. 1. $(x + 4)(x - 3)$                       | 2. $(x + 2)(x - 8)$                             |
| 3. $(3x - 8)(x + 3)$                         | 4. $(4x - 3)(x - 4)$                            |
| 5. $3(2x + 3)(x - 2)$                        | 6. $x^2(x - 2)(x - 3)$                          |
| 7. $3n^2(m - 2)(m^2 + 2m + 4)$               | 8. $(2x + 1)(x - 2)(x + 2)$                     |
| 9. $(m + 2)(m - 2)(m + 4)(m - 4)$            | 10. $(a - 1)(a^2 + a + 1)(a + 2)(a^2 - 2a + 4)$ |
| 11. $(x + 2)(x - 1)(x - 4)$                  | 12. $(x + 2\sqrt{2})(x + 3\sqrt{2})$            |
| 2. 1. $(x + 1 - \sqrt{2})(x + 1 + \sqrt{2})$ | 2. $(x - 2 - \sqrt{3})(x - 2 + \sqrt{3})$       |

สมการตัวแปรเดียว

- |                                |                                |                  |                          |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1. 1. 1, 4                     | 2. $-\frac{3}{4}, \frac{3}{2}$ | 3. 2             | 4. 1, -1, 2              |
| 5. $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ | 6. $-2 \pm \sqrt{3}$           |                  |                          |
| 2. 1. 2, 5, 6                  | 2. 2, 0, -9                    | 3. ไม่มีคำตอบ    | 4. $2, -\frac{3}{2}, -3$ |
| 5. 1, -3, -3                   | 6. ไม่มีคำตอบ                  |                  |                          |
| 3. -1                          | 4. 6, -6                       | 5. 4             | 6. -2                    |
| 7. 2                           | 8. -2                          | 9. $\frac{1}{5}$ | 10. 36                   |
| 11. $22 + 8\sqrt{14}$          | 12. 120                        | 13. 500          | 14. 30                   |
| 15. 12                         |                                |                  |                          |

สมบัติการไม่เท่ากัน

- |                |             |              |            |
|----------------|-------------|--------------|------------|
| 1. 3, 4, 9     |             |              |            |
| 2. 1. 8 และ 15 | 2. 3 และ 10 | 3. 12 และ 36 | 4. 2 และ 6 |
| 5. 3 และ 18    |             |              |            |




11.  $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

12.  $(-2, \frac{1}{2}) \cup (4, \infty)$

13. 2

14.  $\frac{1}{4}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{2}$



2. 3

3. 4

4.  $\sqrt{3} - 1$

5. 9

6. 5

7. 5

8. 6

เครดิต

ขอบคุณ คุณครูเบิร์ต จาก กวดวิชาคณิตศาสตร์ครูเบิร์ต ย่านบางแค 081-8285490

คุณ John Quod

ที่ช่วยตรวจคำตอบความถูกต้องของเอกสาร